

Cyanistes caeruleus

La Cinciarella (*Cyanistes caeruleus* [Linnaeus, 1758](#)) è un [uccello passeriforme](#) appartenente alla [famiglia](#) dei [Paridi](#).

Caratteristiche



È lungo circa 10.5-12 cm e pesa intorno ai 12 gr. Il piumaggio è molto vivace, presentando per entrambi i sessi una colorazione blu cobalto sulla nuca, sulle ali e sulla coda, verdastra sul dorso, una mascherina bianca, attraversata da una linea nera all'altezza degli occhi, e petto giallo zolfo. Ha il becco nero a punta e zampe corte e robuste grigio-blu. I giovani sono molto più gialli degli esemplari adulti, ed hanno un carattere particolarmente giocoso (spesso si possono osservare individui assieme ad esemplari di [codibugnolo](#)). Nonostante le dimensioni ridotte, è un animale estremamente combattivo se disturbato, tale da renderlo l'incubo degli inanellatori.

Distribuzione e habitat

Molto popolare in [Italia](#) e in [Europa](#), ma anche in alcune zone dell'[Africa](#) nord-occidentale e del [Medio Oriente](#).

Vive prevalentemente nei boschi collinari e pianeggianti, ma è anche un assiduo frequentatore di [frutteti](#) e [giardini](#) dove è possibile ammirarlo nelle sue acrobazie tra i rami, alla ricerca di cibo. Evita gli spazi aperti per paura dei [rapaci](#) e se lo fa si innalza parecchio.

Biologia

Alimentazione

La cinciarella è un [insettivoro](#).

Il suo cibo preferito consiste in [coccidi](#), [afidi](#), [larve](#), [ragni](#) e piccoli [invertebrati](#) che trova sugli alberi.

Nel periodo invernale non disdegna comunque [semi](#), [bacche](#) e [frutta](#).

Riproduzione e nidificazione

Il periodo dell'accoppiamento inizia a febbraio.

La cinciarella nidifica in qualsiasi cavità degli alberi, ceppi, muri o nei nidi artificiali. Lo stesso nido è utilizzato anno dopo anno e costantemente protetto durante la cova. Viene realizzato

utilizzando [muschio](#), [lana](#), [peli](#) e [piume](#) e le uova (normalmente 7-10 con guscio bianco screziato da punti scuri) vengono deposte tra Aprile e Maggio e covate per circa 15 giorni. I piccoli vengono accuditi da tutti e due i genitori per 15-20 giorni.

Canto

Il canto è molto articolato e può essere udito tutto l'anno ma maggiormente nel periodo da Febbraio a Giugno. Varia tra un vivace *tee, tee, tee* ad un rimbrottante *churr*.

Curiosità

Un interessante esempio di strategia alimentare e trasmissione di insegnamenti tra gli uccelli è un fenomeno iniziato negli anni '60 in [Inghilterra](#), quando le cinciarelle impararono ad aprire a colpi di becco i tappi in alluminio delle tradizionali bottiglie del latte per berne il cremoso contenuto. Se disturbate mentre sono nel nido, le cinciarelle emettono un sibilo simile a quello dei serpenti, e possono cercare di saltare nel tentativo di intimorire l'aggressore.

Fonte wikipedia.it